



Ficha Técnica

Coctail-Art RevitaScience

Producto	Coctail-Art
Presentación	Frasco ámbar de 50 mL
Concentración	mg/mL
Colágeno hidrolizado tipo II	5
Glucosamina	5
Ácido hialurónico	0.2
Metilsulfonilmetano	10
Vitamina C	2
Silicio	0.2
Zinc	0.5
Manganeso	0.1
Categoría	Suero regenerativo

Descripción General

Coctail-Art es un suero intravenoso diseñado para el **cuidado y regeneración de las articulaciones**, formulado con aminoácidos bioactivos, glicosaminoglicanos, minerales esenciales y cofactores antioxidantes. Su objetivo es nutrir, reparar y proteger el cartílago articular, reducir la inflamación y mejorar la movilidad en pacientes con desgaste o daño articular.

Ventajas terapéuticas

- Estimula la regeneración del cartílago articular (condrogénesis).
- Disminuye la inflamación articular crónica.
- Aporta componentes estructurales esenciales (colágeno, glucosamina, ácido hialurónico).
- Mejora la lubricación sinovial y reduce el dolor.
- Ideal para uso complementario en osteoartritis, lesiones deportivas o envejecimiento articular.



Mecanismo de Acción Propuesto

Coctail-Art actúa a través de:

- **Estimulación de síntesis de matriz extracelular:** el colágeno tipo II hidrolizado y la glucosamina activan la producción de proteoglicanos y colágeno nativo.
- **Reducción de inflamación:** gracias al MSM, silicio orgánico y vitamina C.
- **Aporte de precursores bioquímicos** para la regeneración del cartílago y la lubricación sinovial.
- **Soporte antioxidante** para evitar la degradación oxidativa de tejidos articulares.

Indicaciones de uso (Coadyuvante)

- Osteoartritis leve a moderada (rodilla, cadera, columna, hombro).
- Lesiones articulares por sobreuso o postquirúrgicas.
- Enfermedades degenerativas articulares.
- Suplemento regenerativo en medicina del deporte y longevidad.
- Dolor articular crónico de origen inflamatorio o degenerativo.

Posología y Vía de Administración

La dosificación debe individualizarse según el juicio clínico, estado funcional, peso del paciente y objetivos terapéuticos. Protocolos de referencia (orientativos):

Dosis recomendada: 5 a 10 en 250 mL de solución salina.

Vía de administración: infusión intravenosa lenta

Nota técnica: Se entiende por *infusión intravenosa lenta* la administración controlada y progresiva del contenido del suero directamente al torrente sanguíneo mediante venoclisis (gotero), bomba de infusión o jeringa bomba, durante un periodo mínimo de **75 a 90 minutos** para 250 mL de solución salina.

Este tipo de infusión permite una **mejor tolerancia**, evita efectos adversos por velocidad (como rubor, náusea o dolor en el sitio de punción) y optimiza la biodisponibilidad de componentes bioactivos como colágeno, glucosamina y minerales.

Frecuencia terapéutica sugerida:

Fase inicial: 1 sesión semanal durante 6–10 semanas

Mantenimiento: 1 sesión cada 2–4 semanas, según evolución clínica



Estabilidad y Almacenamiento

- Conservar entre 15–28 °C. No congelar.
- Proteger de la luz directa; mantener en frasco ámbar cerrado.
- Estabilidad sin abrir: 24 meses a 15–28 °C.
- Una vez abierto: usar inmediatamente o dentro de los 90 días si se mantiene la asepsia; desechar remanente si hay turbidez o cambio de color.

Posibles efectos secundarios

Tipo	Efecto	Frecuencia estimada
Locales	Dolor, enrojecimiento o endurecimiento en el sitio de aplicación	Poco frecuente
Sistémicos	Fiebre leve, escalofríos, malestar general	Raro
Alérgicos	Rash, prurito, urticaria, broncoespasmo	Muy raro
Renales	Elevación transitoria de creatina sérica	Muy raro
Otros	Cefalea, náuseas leve	Poco frecuente

Información Regulatoria

Producto estéril, apirógeno, sin conservadores. Filtrado a 0.22 µm y formulado en condiciones asépticas. Compatible con normativa COFEPRIS para preparaciones magistrales o terapias IV aplicadas en consultorio.

Seguridad, Advertencias y Precauciones

- Producto de uso exclusivo por profesionales de la salud.
- No usar en embarazo o lactancia sin evaluación médica.
- Contraindicado en pacientes con alergia conocida a mariscos.
- Usar con precaución en insuficiencia renal o hepática grave.
- No mezclar en el mismo frasco con medicamentos no compatibles.
- Suspender si se presentan signos de reacción adversa sistémica.